

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Санрой полосок
для привлечения роёв пчёл

(производитель: ООО «АПИ-САН», Москва)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование препарата: Санрой полоски (Sanroy strips)
2. По внешнему виду представляет собой полоски картона размерами 100×20×1мм.
3. Санрой полоски выпускают в полимерных фольгированных пакетах по 10 полосок.
4. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения- 3 года со дня изготовления. Запрещается применение препарата по истечении срока его годности. Хранят Санрой полоски в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5 до 25°С.
5. Санрой полоски следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный препарат с истекшим сроком годности и упаковку утилизируют с бытовыми отходами.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Санрой полоски относятся к группе привлекающих медоносных пчел препаратов (аттрактантов). Входящие в состав аттрактанта эфирные масла обладают привлекающим действием для медоносных пчёл.

8. Санрой полоски по степени токсического воздействия на организм теплокровных животных аттрактант относится к мало опасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Не обладает резорбтивно-токсическим, сенсibiliзирующим, канцерогенным, мутагенным и тератогенным свойствами. В рекомендуемых дозах не токсичен для пчёл, не оказывает отрицательного влияния на качество товарной продукции пчеловодства.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

9. Аттрактант применяют для привлечения и поимки роёв пчёл на пасеках в период роения пчелиных семей – с начала июня и до конца лета.

10. Для предупреждения потери и для поимки роёв подготавливают несколько ульев или ловушек (толщина стенок не менее 10 мм., диаметр летка 20–25 мм.), оснащённых не менее 4–6 сотовыми рамками (2–3 лет использования) и вощиной. Ульи выставляют на южной стороне пасеки в один ряд. Ловушки развешивают на шестах или деревьях на уровне 3–5 метров от земли (летками на юго-восток) со стороны господствующих ветров или на расстоянии 100–800 метров от пасеки. На передние стенки ульев/ловушек в летковой зоне прикрепляют по 1 полоске Санроя, внутри между рамками на V-образном металлическом крючке или деревянной шпильке подвешивают еще по 1 полоске.

11. В роевнях используют по 1 полоске препарата, закрепляя их на внутренних стенках роевн. Подготовленные роевни развешивают на южной стороне пасеки в один ряд на шестах или на деревьях на уровне 3–5 метров от земли со стороны господствующих ветров или на расстоянии 100–800 метров от пасеки. После поимки роя и выдерживания его в прохладном тёмном помещении до вечера пчёл пересаживают в улей на соторамки. Роевни с аттрактантом можно использовать для повторных поимок роёв.

12. Одновременно проводят дезинфекцию задействованного в поимке роёв пасечного инвентаря и оборудования одним из разрешенных к применению в пчеловодстве дезинфектантов.

13. Ульи с заселёнными роями неизвестного происхождения в течение 30 дней содержат на некотором удалении от основных семей пасеки (в карантине). В этот период за семьями ведут наблюдение, используя специально выделенные инструменты и инвентарь; в случае обнаружения заболеваний производят необходимые лечебные мероприятия разрешёнными к применению ветеринарными препаратами.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО “АПИ-САН”, Московская область, г. Балашиха, Новомилетский с/о, Полтевское шоссе, владение 4

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО “АПИ-САН”, г. Москва, ул. Щепкина, д. 25/20, комн. 4